

Traducere din limba italiana

EUROVIX
BIOTEHNOLOGIE
PENTRU VIATA

Viale Europa, 10-25046 Cazzago S.M. (BS) Italia – Tel. 030/7750570 – Fax
030/725361 – Cod TVA 01542950983 – C.F. 02055250175 Capital Social
€ 1.000.000 i.v. Nr inscriere R.E.A. 290901 din 18-11-1985 – Registrul
Firmelor din Brescia Nr 029.32105 Numar inscriere Ministerul Universitatii
Cercetarii Stiintifice si Tehnologice 802210H2

MICOTRIC L

Produs cu actiune specifica.

Compozitie: Micorize (endomycorize *Glomus* spp.) ...0,2%; Tricoderma (*Trichoderma* spp.) 6×10^7 CFU/g; Bacterii din rizosfera $1,2 \times 10^5$ CFU/g; matrice organica.

MICOTRIC L. este un produs inovativ obtinut prin tehnologii de avangarda. Imbunatateste echilibrul microbiologic al solului sporind rezistenta naturala a plantelor la stress atat de natura biotica (putreziciuni, patogeni, etc) cat si de natura abiotica (termic, nutritional, excese sau lipsa apei sau a fertilizatorilor, fitotoxicitate, etc).

Este constituit dintr-o combinatie sinergica de spori si miceliu de micorize, ciuperci saprofite din sol cu actiune simbiotica in relatia cu plantele, bacterii din rizosfera si este caracterizat printr-un continut natural ridicat de enzime cu activitate de stimulare si sinergizare (chitinaza, chitobioxidaza, glucanaza, β 1,3 glucoxidaza, glucozaminidaza, xilanaza, etc) produse de microorganismele propriu-zise si perfect conservate datorita procesului productiv exclusiv. Imbunatateste starea generala a plantei si calitatea productiilor. Microorganismele prezente in produs sunt inofensive pentru plante, oameni si animale, provin din derivare naturala, cu impact redus sau nul asupra mediului.

DOMENII DE APLICARE SI DOZAJ

Se aplica inca de la primele stadii de dezvoltare si prin urmare ca tratament la semanat, transplantare, in timpul inradacinarii butasilor, la transvazare si, in general, la reluarea vegetativa a plantelor.

- **Culturi horticole si ornamentale :**

300-500 g/ 1.000 mp (3-5 Kg/ha) terenuri exploatate – 600-1000 g / 1000 mp (6-10 Kg/ha) terenuri saracite. Tratati la plantare sau semanare. Se recomanda repetarea o data dupa 7-10 zile si inca o data la jumatatea ciclului cultural (*in doze reduse conform indicatiilor serviciului tehnic EUROVIX*).

- **Tratament inainte de transplantare:**

Ridicati usor cuburile din alveole. Emulsionati 500 g de produs in 100 litri de apa si cufundati recipientele pana la portiunea dintre radacina si tulpina a plantelor. Repetati tratamentul dupa transplantare in fertirigare.

- **Culturi arborescente :**

5-10 g / planta in aplicatii localizate. 5-8 Kg/ha in fertirigare. Se recomanda repetarea tratamentului dupa 2 luni, si apoi o data la sase luni pornind din faza vegetativa.

- **Covoare erbacee:**

500-1.000 g/1.000 mp si in plus in functie de necesitati. La semanare, la reluarea vegetativa si in perioadele cu risc de stres.

- **Rasadnite, pepiniere :**

Amestecat in pamant amestecat cu substante animale si vegetale / substrat 400 – 700 g/metru cub de pamant amestecat cu substante animale si vegetale.

PREGATIRE, DOZE SI MODALITATI DE UTILIZARE

Produsul lichid si in suspensie poate fi diluat / emulsionat in mod oportun in apa pentru diferite aplicatii: spray, irigare, baie, incorporare in pamant amestecat cu substante animale si vegetale / substrat, sau aplicat ca atare pe teren in jurul tulpinii plantei. Agitati bine produsul inainte de utilizare si varsati cantitatea dorita din acesta intr-o galeata adaugand apa pentru diluare. Se recomanda sa adaugati si cel putin o cantitate egala de Biokalium. Se obtine un lichid omogen cu particule in suspensie, care va fi aplicat in 24 de ore dupa ce a fost agitat.

Atentie: pentru utilizarea in fertirigare cu picatori, pre-filtrati cu un tifon foarte fin. Restul de filtrare, constituit din partea micelara a produsului, deci pretios, poate fi reutilizat aplicand cu un alt mijloc pe cultura (de ex pentru iroratie inainte de diluare sau pentru baia plantelor sau pentru irigatii localizate in portiunea dintre tulpina si radacina plantelor, etc)

COMPATIBILITATE

MICOTRIC L. se utilizeaza de obicei singur. Este compatibil cu fertilizatori si cu produse cu actiune insecticida. Este compatibil si cu o gama vasta de fungicide (solicitati informatii la serviciul tehnic EUROVIX). In mod sigur excludeti combinatiile cu Benomyl, Propiconazol, Triflumizol, Imazalil. In cazul in care aveti dubii, utilizati alte produse cel putin 10 zile inainte sau dupa tratament.

INMAGAZINARE SI PASTRARE

MICOTRIC L va fi pastrat in ambalaje inchise in mediu uscat si racoros (5-25°C) de preferat in frigifer. Dupa diluare, aplicati produsul in 24-48 ore.

AVERTIZARI

Utilizati exclusiv in agricultura evitand raspandirea in mediu. Nu aplicati cu mijloace aeriene. Nu lasati la indemana copiilor. Pastrati la distanta de alimente sau hrana animalelor si bauturi. Evitati contactul cu ochii si pielea. Cine foloseste produsul este responsabil pentru eventualele daune rezultate din utilizarea improprie a preparatului.

LIMITAREA RESPONSABILITATII

Se considera ca informatiile mentionate mai sus sunt corecte si de incredere. Aceste informatii sunt pur si simplu reprezentative si nu exista garantii, exprese sau implicite, pentru prestatii. Pentru ca nici distribuitorul nici producatorul nu au nici un control asupra depozitarii, manipularii sau conditiilor de aplicare a produsului, nici distribuitorul nici producatorul nu vor putea fi considerati responsabili pentru pierderi sau daune de orice fel derivand direct din depozitarea, aplicarea sau utilizarea produsului descris.