

EUROFLORID -fisa tehnica

Ingrasamant organic azotat. Biopromotor

Azotat organic 5.1%

Aminoacizi 25-30% (Istinina, Fenilalanina, Ac. Aspartic, Ac. Glutamic, Hidroxiprolina, Izoleucina, Treonina, Prolina, Arginina, Metionina, Serina, Glicina, Cisteina, Cistina, Triptofan, Leucina, Valina, Alanina, Lisina, Tirosina, Ac. Aminobutiric)

Potasiu 2-3 % (valoarea indicativa la fel de natural continuta in materiile de origine)

Sunt deasemenea prezente, compusi naturali in materiile organice, factori nutritionali, bio-promotori si enzimatici.

Produs cu actiune nutritiva si bio-promotor bogat in aminoacizi liberi si oligopeptide (substante de natura proteica pe baza de greutate moleculara) in forma biologic activa si prin urmare extrem de rapid asimilabila. Aminoacizi liberi sunt obtinuti prin procese de hidroliza enzimatica a substantelor proteice selectionate bogate in pretiosi factori bio-vitalizanti si nutritionali esentiali pentru activitatea biologica a vegetalelor.

AVANTAJE:

- ❖ Stimuleaza si hraneste plantele stresate si slabite care vin asa ajutate sa se recupereze cu usurinta
- ❖ Imbunatateste rezistenta plantelor la stresul climatic si la adversitati
- ❖ Poseda proprietati de chelatare in confruntarile dintre microelemente care vin prin urmare eliberate usor si utilizati de plante, reducand formele diversele de cloroze si microcarente si determinand ecologizarea foliara
- ❖ Favorizeaza inflorirea abundenta si o optima recuperare vegetativa
- ❖ Imbunatateste caracteristicile calitative (colratie, parfum, durata) etc.
- ❖ Dezvolta o eficienta actiune transportoare in confruntarie dintre fertilizanti a caror actiune vine prin urmare considerabil imbogatita si accelerata
- ❖ Integreaza si compecteaza actiunea extraselor humice in aplicarile simultane (mereu sfatuite)

Mod de utilizare si doze:

pe cale foliara (aplicati la distante de 15-20 zile):

- culturi horticole in camp plin : 200-300 g/hl sau 2,5-3 kg /ha (in sera nu altele 200-250g/hl)
- plante cu fructe: 250-300 g/hl
- cereale: 2,5-5 kg /ha

In fertilizare prin irigare (la fiecare 15-20 zile plecand de la inceputul ciclului cultural)

- culturi horticole in sera : 1-1.5kg/1000 mp (in medie 4-6 kg /1000 mp pe intreg ciclu cultural)
- flori si horticole in camp : 5-8 kg /ha (in medie 25-30 kg/ha pe intregul ciclu cultural)
- plante arboree: 8-15 kg

Ar trebui sa se combine cu **EUROHUMIC** (in acest caz dozajul de **EUROFLORID** si se poate micsora la 0,5-1 kg/1000 mp)

Plante in situatii de stres (inghetate, grindina, atacuri parazitare, tratamente cu fitofarmaceutice sau erbicide etc.) interventia, dupa dozajele sfatuite, dupa 1-3 zile de la evenimentul care a cauzat stresul.

Efectuati o alta interventie dupa 7-10 zile.

Avand in vedere proprietatea transportoare nu utilizati in amestec cu produse pe baza de cupru imediat dupa aplicare a acestor produse(asteptati 8 zile). Evitati dealtfel si amestecul cu Dinocarp (Karathane) si nitroderivanti. Urmati avertismentele indicate pe eticheta.